

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 双鈎順気

ソウコウジュンキ

68

分包

ウチダの双鈎順気は、漢方処方にしたいが生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸虚弱で冷え症の人。
 - (4) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感
- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

慢性に続く頭痛で中年以降、又は高血圧の傾向のあるもの

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 歳以上）	1 包
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品1日量〔3包（1包2g）〕中

チョウトウコウ	1.5 g
キッピ	1.5 g
ハンゲ	1.5 g
バクモンドウ	1.5 g
ブクリョウ	1.5 g
ニンジン	1.0 g
ボウフウ	1.0 g
キクカ	1.0 g
カンゾウ	0.5 g
ショウキョウ	0.5 g
セッコウ	2.5 g

釣藤散料エキス・・・・・・・・・・3.22 g

賦形剤として乳糖水和物、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸 Mg、その他 1 成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4