

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 通導散

ツウドウサン

ウチダの通導散は漢方処方にしたがって、生薬を配合して製した散剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

4. 1 ヶ月位（便秘に服用する場合には 5 ～ 6 日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

打撲により内出血を起こし、重篤なもので、大小便通せず、腹部膨満し、みぞおちも緊張し上衝^{注)}が強いもの。

注) 「上衝^{じやうしやう}」とは気が上にのぼること、のぼせを指します。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前 1 時間または食間空腹時に水または温湯で服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 歳以上）	2.0 g
15 歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

添付の匙はすり切りで、1 杯が約 1 g です。

成分・分量

本品 25.0 g 中

ダ イ オ ウ	3.0 g	チ ン ビ	2.0 g
キ コ ク	3.0 g	モ ク ツ ウ	2.0 g
ト ウ キ	3.0 g	コ ウ カ	2.0 g
硫酸ナトリウム	4.0 g	ソ ボ ク	2.0 g
コ ウ ボ ク	2.0 g	カ ン ソ ウ	2.0 g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4