

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 通導散料

ツウドウサンリョウ

ウチダの通導散料は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 次の症状のある人。
むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1 ヶ月位（便秘に服用する場合には 5 ～ 6 日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水約 600mL を加え、あまり強くない火にかけ、約 300mL に煮つめ、袋をとり出し、3 回に分けて食前 1 時間又は食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品 1 袋（1 日分）中

ト	ウ	キ	3.0 g	モ	ク	ツ	ウ	2.0 g
ダ	イ	オ	ウ	3.0 g	コ	ウ	カ	2.0 g
キ	ジ	ツ	3.0 g	カ	ン	ゾ	ウ	2.0 g
コ	ウ	ボ	ク	2.0 g	乾燥硫酸ナトリウム			1.8 g
チ	ン	ビ	2.0 g	ソ	ボ	ク		2.0 g
全 量								22.8 g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 03-3806-4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

比較的体力があり、下腹部に圧痛があって便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身（打撲）、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4