

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

# ウチダの漢方製剤

## ウチダの 当帰建中湯

トウキケンチュウトウ

ウチダの当帰建中湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称           | 症 状                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つ<br>っぱり感やこわばりに加<br>えて、脱力感、筋肉痛があ<br>らわれ、徐々に強くなる。 |

- 1 ヶ月位（下腹部痛に服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 成分・分量

|   |   |   |       |       |       |       |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| ト | ウ | キ | 4.0 g |       |       |       |
| ケ | イ | ヒ | 4.0 g |       |       |       |
| シ | ヨ | ウ | キ     | ヨ     | ウ     | 1.0 g |
| タ | イ | ソ | ウ     | 4.0 g |       |       |
| シ | ャ | ク | ヤ     | ク     | 5.0 g |       |
| カ | ン | ゾ | ウ     | 2.0 g |       |       |

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

### ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 0 3 - 3 8 0 6 - 4 1 4 1

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

### 効能・効果

虚弱体質で疲労しやすく、直腹筋拘攣<sup>注</sup>し、貧血の傾向あり、腹痛、下腹より腰背におよぶ疼痛、下血などを伴うもの。  
婦人の腹痛、子宮出血、月経痛、産後の衰弱、坐骨神経痛、腎石症、腰痛、脊椎カリエス

注）「<sup>こうれん</sup>拘攣」とは筋肉がひきつり<sup>けいれん</sup>痙攣することを指します。

### 用法・用量

| 年 齢        | 1 日 量                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大人（15 歳以上） | 1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し 2 ～ 3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。 |
| 15 歳未満     | 服用しないこと                                                                                                    |

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる場合がありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4