

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 当帰芍薬散料

トウキシャクヤクサンリョウ

ウチダの当帰芍薬散料は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、 <u>かゆみ</u>

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水約 600mL を加え、あまり強くない火にかけ約 300mL に煮つめ、袋をとり出し、3 回に分けて食前 1 時間又は食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品 1 袋（1 日分）中	
ト ウ キ	3.0 g
センキュウ	3.0 g
シャクヤク	4.0 g
ブクリョウ	4.0 g
ソウジュツ	4.0 g
タ ク シ ャ	4.0 g
全 量	22.0 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

＊ ＊ 本剤中にはソウジュツが配合されているため袋内に白色の結晶が析出することがありますが、品質上は問題ありません。本剤は生薬を原料としていますので製品により多少色が異なることがありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8