

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 八味丸料

ハチミガンリョウ

ウチダの八味丸料は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
- 次の人は服用しないこと
- (1) 胃腸の弱い人．
- (2) 下痢しやすい人．



相談すること

- 1．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
- (1) 医師の治療を受けている人．
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人．
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人．
- (4) 今までに薬により発疹・発赤，かゆみ等を起こしたことがある人．

- 2．次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤，かゆみ
消化器	食欲不振，胃部不快感，腹痛
その他	のぼせ，どうき

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

- * 3．次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
- 下痢

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること．
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること．
- (3) 他の容器に入れ替えないこと．（誤用の原因になったり品質が変わる．）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

疲労倦怠感がいちじるしく、口渇、尿量異常（減少または増大）、手足冷感または煩熱^{はんねつ}、下腹部弛緩麻痺または緊張があり、腰痛、浮腫、眩暈^{げんうん}などを伴うもの。

腎炎、ネフローゼ、膀胱炎、糖尿病、血圧異常、動脈硬化症、坐骨神経痛。

注）「眩暈」とはめまいを指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品 1 袋中

ジ オ ウ	5.0 g	ブ ク リ ョ ウ	3.0 g
サン シ ュ ク	3.0 g	ボ タ ン ピ	3.0 g
サン ヤ ク	3.0 g	ケ イ ヒ	1.0 g
タ ク シ ャ	3.0 g	ブ シ 末 1	0.3 g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8