

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤
ウチダの 平胃散
ヘイイサン

ウチダの平胃散は漢方処方にしたがって、生薬と生薬末を配合して製した散剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

＊ (2) 1 ヶ月位（急性胃炎に服用する場合には 5 ～ 6 回）服用しても症状がよくならない場合

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

消化障害があつてみぞおちがつかえ、胃部膨満感があり食欲不振で食後腹鳴があり、下痢しやすいもの。

急性慢性胃炎、過食による喘息^{ぜんそく}、胃腸虚弱で風邪をひきやすいもの。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前 1 時間または食間空腹時に水または温湯で服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 才以上）	1.0～2.0 g
15 才未満 5 才迄	0.5～1.0 g
5 才未満	0.3～0.6 g

用法・用量に関連する注意

- (1) 添付のサジはすり切りで、大サジ 1 ばいが約 1 g、小サジ 1 ばいが約 0.1 g です。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

＊ ＊ (3) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1000 g 中
ソウジュツ末 325 g
コウボク末 160 g
チンピ 190 g
タイソウ 135 g
ショウキョウ末 55 g
カンゾウ末 135 g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8