

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの **平胃散料** エキス散

ハイイサンリョウ

ウチダの平胃散料エキス散は、漢方処方にしたいがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすく散剤（細粒）としたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
- * (2) 1 ヶ月位（急性胃カタルに服用する場合には 5 ～ 6 回）服用しても症状がよくなる場合

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

胃がもたれて消化不良の傾向のある次の諸症：
急・慢性胃カタル、胃アトニー、消化不良、食欲不振

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 歳以上）	2 g
15 歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

添付のサジ 1 ばいが約 1 g です。

成分・分量

本品 1 日量（6.0 g）中

平胃散料エキス・・・・・・・・・・2.24 g

ソウジュツ・・・・・・・・・・2.4 g
コウボク・・・・・・・・・・1.8 g
チンピ・・・・・・・・・・1.8 g
タイソウ・・・・・・・・・・1.2 g
カンゾウ・・・・・・・・・・0.6 g
ショウキョウ・・・・・・・・・・0.3 g

賦形剤として乳糖・バレイショデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸 Mg、結合剤としてヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8