

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 補中益気湯

ホチュウエキクトウ

ウチダの補中益気湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剂で、特異な芳香があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
 - 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
- * (2) 1 ヶ月位（感冒に服用する場合には 5 ～ 6 日間）服用しても症状がよくならない場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成分・分量

本品 1 袋中

オ	ウ	ギ	4.0 g	タ	イ	ソ	ウ	2.0 g
ニ	ン	ジ	ン	4.0 g	カ	ン	ソ	ウ
ビ	ャ	ク	ジュツ	4.0 g	サ	イ	コ	1.0 g
ト	ウ	キ	3.0 g	シ	ョウ	キョウ		0.5 g
チ	ン	ビ	2.0 g	シ	ョ	ウ	マ	0.5 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

胃腸の機能が減退し、疲労倦怠感があるもの、あるいは、食欲不振、悪寒、盗汗^{注)}などを伴うもの。

虚弱体質改善、病後の体力増強、夏やせ、虚弱者の感冒

^{注)}「^{とうかん}盗汗」とはねあせを指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加えあまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ袋をとり出し 2 ～ 3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる場合がありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8