

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第 2 類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

## ウチダの 補中益気湯

ホチュウエッキトウ

ウチダの補中益気湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
むくみ
  - (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称       | 症 状                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等が見られ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- 1 ヶ月位（感冒に服用する場合には 5～6 日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

胃腸の機能が減退し、疲労倦怠感があるもの、あるいは、食欲不振、悪寒、盗汗<sup>注)</sup>などを伴うもの。

虚弱体質改善、病後の体力増強、夏やせ、虚弱者の感冒

<sup>注)</sup>「<sup>とうなん</sup>盗汗」とはねあせを指します。

## 用法・用量

| 年 齢        | 1 日 量                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大人（15 歳以上） | 1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加えあまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮詰め袋を取り出し 2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。 |
| 15 歳未満     | 服用しないこと                                                                                                |

## 成分・分量

|         |   |   |       |
|---------|---|---|-------|
| 本品 1 袋中 |   |   |       |
| オ       | ウ | ギ | 4.0 g |
| ニ       | ン | ジ | 4.0 g |
| ビ       | ャ | ク | ジュツ   |
| ト       | ウ | キ | 3.0 g |
| チ       | ン | ピ | 2.0 g |
| タ       | イ | ソ | ウ     |
| カ       | ン | ソ | ウ     |
| サ       | イ | コ | 1.0 g |
| シ       | ョ | ウ | キョウ   |
| シ       | ョ | ウ | マ     |

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4