

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第 2 類医薬品

# ウチダの漢方製剤

## ウチダの 麻杏甘石湯 エキス散

マキョウカンセキトウ

ウチダの麻杏甘石湯エキス散は、漢方処方にしたがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすく細粒としたものです。



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称           | 症 状                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つ<br>っぱり感やこわばりに加<br>えて、脱力感、筋肉痛があ<br>らわれ、徐々に強くなる。 |

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



## 使用上の注意

## 成分・分量

本品 6g（1 日分）中

麻杏甘石湯エキス……………1.7g

（マオウ……………3.0g  
キョウニン……………3.0g  
カンゾウ……………1.5g  
セッコウ……………7.5g）

賦形剤として乳糖水和物・バレイショデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 0 3 - 3 8 0 6 - 4 1 4 1

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

## 効能・効果

小児ぜんそく、気管支ぜんそく

## 用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前または食間に服用する。

| 年 齢          | 1 回 量   |
|--------------|---------|
| 大人（15 才以上）   | 2g      |
| 15 才未満 7 才以上 | 1.3g    |
| 7 才未満 4 才以上  | 1g      |
| 4 才未満 2 才以上  | 0.7g    |
| 2 才未満 1 才以上  | 0.5g    |
| 1 才未満        | 服用しないこと |

## 用法・用量に関連する注意

- 添付のサジ 1 ぱいが約 1 g です。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4