

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

◆ウチダの漢方便秘薬◆

ウチダの 麻子仁丸

マシニンガン

ウチダの麻子仁丸は、漢方処方にしたがって、生薬を配合し、粉末化して丸剤としたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

 - (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

便秘

用法・用量

次の1回量を1日1～3回食前又は食間、あるいは就寝前に服用する。

年 齢	1 回 量
成人（15 歳以上）	20～30 丸
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品 9.231 g（90 丸 1 日分）中

マシニン	5 g	} 以上の割合で混合 し粉末化したもの 7.692 g
シャクヤク	2 g	
キジツ	2 g	
コウボク	2 g	
ダイオウ	4 g	
キョウニン	2 g	

丸薬の結合剤としてハチミツを含有する。

*◆本剤は天産原料をそのまま丸剤としていますので、成分が丸剤表面に白色～黄色の結晶となって生じる場合がありますが、品質上は問題ありません。

◆本剤は生薬を原料としていますので製品により多少色が異なる場合がありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8