

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第 2 類医薬品

## ウチダの漢方製剤

## ウチダの 抑肝散加陳皮半夏 エキス散

ヨクカンサンカチンピハンゲ

ウチダの抑肝散加陳皮半夏エキス散は、漢方処方にしたがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすく散剤（細粒）としたものです。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと  
生後 3 ヶ月未満の乳児。



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 1 ヶ月位（小児夜泣きに服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 成分・分量

本品 1 日量（7.5 g）中

抑肝散加陳皮半夏エキス……………3.15 g

|              |        |
|--------------|--------|
| ハンゲ……………     | 2.5 g  |
| ビャクジュツ……………  | 2.0 g  |
| ブクリョウ……………   | 2.0 g  |
| センキュウ……………   | 1.5 g  |
| チンピ……………     | 1.5 g  |
| トウキ……………     | 1.5 g  |
| サイコ……………     | 1.0 g  |
| カンゾウ……………    | 0.75 g |
| チョウトウコウ…………… | 1.5 g  |

賦形剤として乳糖水和物・バレイショデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

## 効能・効果

体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：  
神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、更年期障害、血の道症<sup>注</sup>、歯ぎしり

## 効能・効果に関連する注意

注）「<sup>ちのみちしょう</sup>血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

## 用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前または食間に服用する。

| 年 齢          | 1 回 量        |
|--------------|--------------|
| 大人（15 歳以上）   | 2.5 g        |
| 15 歳未満 7 歳以上 | 大人の 2/3 の量   |
| 7 歳未満 4 歳以上  | 大人の 1/2 の量   |
| 4 歳未満 2 歳以上  | 大人の 1/3 の量   |
| 2 歳未満        | 大人の 1/4 以下の量 |

## 用法・用量に関連する注意

- (1) 添付のサジ 1 ばいが約 1 g です。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-4-10