

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの **抑肝散加陳皮半夏** エキス散(分包)

ヨクカンサンカチンピハンゲ

94

分包

ウチダの抑肝散加陳皮半夏エキス散（分包）は、漢方処方にした
がよい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすい散剤
（細粒）の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

* (3) 胃腸の弱い人。

(4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたこ
とがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医
師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1 ヶ月位（小児夜なきに服用する場合には 1 週間位）
服用しても症状がよくなる場合

成分・分量

本品 1 日量〔3 包（1 包 2.5 g）〕中

抑肝散加陳皮半夏エキス……………3.15 g

ハンゲ……………	2.5 g
ビャクジュツ……………	2.0 g
ブクリョウ……………	2.0 g
センキュウ……………	1.5 g
チンピ……………	1.5 g
トウキ……………	1.5 g
サイコ……………	1.0 g
カンゾウ……………	0.75 g
チョウトウコウ……………	1.5 g

賦形剤として乳糖水和物・バレイショデンプン、吸湿防止剤と
してメタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管するこ
と。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品
質が変わる。）
- (4) 小児で 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を
折り曲げて保管し、2 日以内に服用すること。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店また
は下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症：神経症、不眠症、
小児夜なき、小児疳症。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前または食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 歳以上）	1 包
15 歳未満 7 歳以上	2/3 包
7 歳未満 4 歳以上	1/2 包
4 歳未満 2 歳以上	1/3 包
2 歳未満	1/4 包

用法・用量に関連する注意

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服
用させること。

* ＊ (2) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先
し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる
ことがありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8