

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 抑肝散加陳皮半夏湯

ヨクカンサンカチンピハンゲトウ

ウチダの抑肝散加陳皮半夏湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

* 次の人は服用しないこと

* 生後 3 ヶ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

* (3) 胃腸の弱い人。

(4) 高齢者。

* (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

むくみ

(7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

* (2) 1 ヶ月位（小児夜なきに服用する場合には 1 週間位）

服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水約 600mL を加え、あまり強くない火にかけ約 300mL に煮つめ、袋を取り出し 3 回に分けて食前 1 時間又は食間空腹時に温服する。
15 歳未満 7 歳以上	大人の煎液の 2/3 量を 3 回に分けて食前 1 時間又は食間空腹時に温服する。
7 歳未満 4 歳以上	大人の煎液の 1/2 量を 3 回に分けて食前 1 時間又は食間空腹時に温服する。
4 歳未満 2 歳以上	大人の煎液の 1/3 量を 3 回に分けて食前 1 時間又は食間空腹時に温服する。
2 歳未満	大人の煎液の 1/4 量以下を 3 回に分けて食前 1 時間又は食間空腹時に温服する。

＜用法・用量に関連する注意＞

* (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

* (2) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1 袋（1 日分）中

ト	ウ	キ	3.0 g	カ	ン	ソ	ウ	1.5 g
セ	ン	キ	ュ	ウ	3.0 g	チ	ン	ピ
ソ	ウ	ジュ	ツ	4.0 g	ハ	ン	ゲ	5.0 g
ブ	ク	リ	ヨ	ウ	4.0 g	チ	ョ	ウ
サ	イ	コ	2.0 g	コ	ウ			3.0 g

全 量 28.5 g

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症。

* ◆本剤中にはソウジュツが配合されているため袋内に白色の結晶が析出することがありますが、品質上は問題ありません。

◆本剤は生薬を原料としていますので製品により多少色が異なることがありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8