

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 洗肝明目湯

センカンメイモクトウ

ウチダの洗肝明目湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(4) 胃腸虚弱で冷え症の人。
(5) 高齢者。
(6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
むくみ
(8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりません

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

- ＊ 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（13 才以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し、2 ～ 3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
13 才未満 5 才迄	大人の煎液の 1/2 量を 2 ～ 3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
5 才未満	大人の煎液の 1/3 量を 2 ～ 3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

＊ ＊ (2) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

成分・分量

本品 1 袋中

ト	ウ	キ	1.5g	ケ	イ	ガ	イ	1.0g
セ	ン	キュウ	1.5g	ハ	ッ	カ		1.0g
シャ	ク	ヤク	1.5g	キ	ョウ	カツ		1.0g
ジ	オ	ウ	1.5g	マン	ケイ	シ		1.0g
オ	ウ	ゴン	1.5g	キ	ク	カ		1.0g
サ	ン	シ	1.5g	キ	キ	ョウ	ウ	1.0g
ハ	マ	ボウフウ	1.5g	シ	ツ	リ	シ	1.0g
レ	ン	ギョウ	1.5g	カ	ン	ゾウ		1.0g
ケ	ツ	メイシ	1.5g	セ	ッ	コウ		3.0g
オ	ウ	レン	1.0g					

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

炎症、充血、疼痛などの刺激症状のある角膜、結膜の疾患
硬化性角膜炎、角膜実質炎、春季カタル、虹彩炎

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8