

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 洗肝明目湯

センカンメイモクトウ

ウチダの洗肝明目湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後 3 ヶ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

(4) 胃腸虚弱で冷え症の人。

(5) 高齢者。

(6) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人。

むくみ

(8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（13 才以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
13 才未満 5 才迄	大人の煎液の 1/2 量を 2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
5 才未満	大人の煎液の 1/3 量を 2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。

用法・用量に関連する注意

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1 袋中

ト	ウ	キ	1.5g	ケ	イ	ガ	イ	1.0g
セ	ン	キュウ	1.5g	ハ	ッ	カ		1.0g
シャ	ク	ヤク	1.5g	ト	ウ	ドク	カツ	1.0g
ジ	オ	ウ	1.5g	マ	ン	ケ	イ	シ
オ	ウ	ゴ	ン	1.5g	キ	ク	カ	1.0g
サ	ン	シ	シ	1.5g	キ	キ	ヨ	ウ
ハ	マ	ボ	ウ	フ	1.5g	シ	ツ	リ
レ	ン	ギ	ョ	ウ	1.5g	カ	ン	ゾ
ケ	ツ	メ	イ	シ	1.5g	セ	ッ	コ
オ	ウ	レ	ン	1.0g				3.0g

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

炎症、充血、疼痛などの刺激症状のある角膜、結膜の疾患
硬化性角膜炎、角膜実質炎、春季カタル、虹彩炎

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-4-10