

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 3 類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 排膿散及湯

ハイノウサンキュウトウ

ウチダの排膿散及湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
* (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
* (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
むくみ
(6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- * (2) 5～6 日間服用しても症状がよくならない場合
* 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
* 4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるの
で、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤
師に相談すること

成分・分量

本品 1 袋中	
タ イ ソ ウ	3.0 g
キ ジ ツ	3.0 g
シ ャ ク ヤ ク	3.0 g
キ キ ヨ ウ	4.0 g
カ ン ソ ウ	3.0 g
シ ョ ウ キ ヨ ウ	3.0 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

局所症状だけで全身症状がない急性の化膿性炎症で患部は発赤、腫脹^{注1)}し、堅硬で疼痛を伴うもの。

癰^{注2)}、癰^{注3)}、疔^{注4)}、痔瘻

注1) 「腫 脹^{しゅちやう}」とは、はれを指します。

注2) 「癰^{せつ}」とは毛根を包んでいる部分と皮脂腺の急性炎症を指します。

注3) 「癰^{よう}」とは赤色を呈した痛みの強いはれものを指します。

注4) 「疔^{ちやう}」とは硬くて根が深いはれものを指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にか け 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる
ことがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8