

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 麻黄附子細辛湯

マオウブシサイシントウ

ウチダの麻黄附子細辛湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - 著しく胃腸の弱い人。
 - * (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - * (8) 次の症状のある人。

排尿困難
 - * (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
 - 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - * (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|---|
| 消化器 | 悪心・嘔吐、食欲不振、胃部圧迫感 |
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| その他 | 発汗過多、全身倦怠感、発熱、 <u>どうき</u> 、 <u>のぼせ</u> 、 <u>ほてり</u> |
- * (2) 1 ヶ月位（感冒の場合には 5 ～ 6 日間）服用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3 8 0 6 - 4 1 4 1

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

虚弱で無気力な体質のもので、悪寒、微熱、全身倦怠感があり横臥することを好み、^{おつが}咳嗽^{（注）}、稀薄な痰、身体疼痛などを伴うもの。

虚弱者や老人の感冒、気管支炎、気管支喘息^{ぜんそく}、神経痛。

^{がいそう}注）「咳 嗽」とは痰のある咳を指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し、2 ～ 3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品 1 袋中
マ オ ウ 4.0 g
サ イ シ ン 3.0 g
ブ シ 末 1 0.3 g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8