

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの **木防己湯** エキス散

モクボウイトウ

ウチダの木防己湯エキス散は、漢方処方にしたいがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを散剤としたものです。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸虚弱で冷え症の人。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感
- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

みぞおちがつかえて堅く、顔色は蒼黒く、喘鳴^注があり、呼吸促迫し、下半身の浮腫、利尿減少、口渴などを伴うもの。
心臓病、腎臓病、脚気。

注）「喘鳴^{ぜんめい}」とは喘息^{ぜんそく}して喉中に痰声があるものを指します。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 歳以上）	1.0 g
15 歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

添付のサジ1 ばいが約 1 g です。

成分・分量

本品 3.0 g（1 日分）中

ボウイ	3.0 g	} の水製エキス 0.8 g
セッコウ	10.0 g	
ケイヒ	3.0 g	
チクセツニンジン	3.0 g	

賦形剤として乳糖水和物を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-4-10