

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 苓甘姜味辛夏仁湯

リョウカンキョウミシンゲンントウ

ウチダの苓甘姜味辛夏仁湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。
- | 症状の名称 | 症状 |
|-----------|---|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりません
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成分・分量

本品 1 袋中			
ブクリョウ	4.0 g	カンゾウ	2.0 g
ハング	4.0 g	ショウキョウ	2.0 g
キョウニン	4.0 g	サイシン	2.0 g
ゴミシ	3.0 g		

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

貧血、冷え症で喀痰^{注1)}の多い咳嗽^{注2)}があるもので、浮腫、胃部の水分停滞感、どうき、利尿減少などを伴うもの。

気管支炎、気管支喘息^{ぜんそく}、慢性腎炎

注1) 「^{かくたん}喀痰」とは吐いた痰を指します。

注2) 「^{がいそう}咳嗽」とは痰のある咳を指します。

用法・用量

年齢	1 日 量
大人（15 歳以上）	1 袋（1 日分）につき水 600mL（約 3 合 3 勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約 1 合 7 勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3 回に分けて食前 1 時間または食間空腹時に温服する。
15 歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8