

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

丹心方

丹心方は、漢方でいわれる「瘀血・血滯」を改善するものです。中年以降または血圧が高く、頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸などの症状のある方の血行を改善し、効果をもたらします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬によるアレルギー症状（たとえば発熱、発疹、ぜんそく、かゆみ等）を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹部膨満感、悪心・嘔吐、胃痛
その他	異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

効能・効果

中年以降または高血圧傾向のあるものの次の諸症：
頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回、食間または空腹時に服用する。

年 齢	1 回 量
成人（15 歳以上）	1 包
15 歳未満	服用しないこと

成分・分量

1 日量 3 包（1 包 2 g）中

二号方エキス	4.5 g
センキュウ	2.250 g
シャクヤク	2.250 g
コウカ	2.250 g
モッコウ	1.125 g
コウブシ	1.125 g
丹参	4.500 g

賦形剤として乳糖水和物・バレイショデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8