第2類医薬品

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。 J2

胃痛・腹痛に　　鎮痛鎮痙剤

ブスコパン®Mカプセル

BUSCOPAN®-M CAPSULES

胃痛･腹痛･さしこみなどの痛みは、胃腸の過度の緊張やけいれんによっておこります。**ブスコパンMカプセル**は、胃腸の異常な緊張を和らげ､胃痛･腹痛･さしこみなどにすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください

⑴本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

⑵透析療法を受けている人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の胃腸薬（ロートエキスを含有する製剤）、他の胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(目のかすみ､異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

⑴医師の治療を受けている人。⑵妊婦又は妊娠していると思われる人。⑶高齢者。⑷本人又は家族がアレルギー体質の人。⑸薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。⑹次の症状のある人。排尿困難 ⑺次の診断を受けた人。心臓病、緑内障、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

⑴服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症　状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん､浮腫､胸苦しさ等とともに､顔色が青白くなり､手足が冷たくなり､冷や汗､息苦しさ等があらわれる。

⑵5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

®：登録商標

効能・効果

胃痛、腹痛、さしこみ（疝痛、癪）、胃酸過多、胸やけ


胃痛


腹痛


胸やけ

用法・用量

次の１回量を１日3回を限度として服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年　齢	成人（15才以上）	15才未満
１回量	１カプセル	服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

⑴用法・用量を厳守してください。

⑵カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



（PTPシートの取り出し図）

成分と作用

成　　分	1カプセル中	作　　用
ブチルスコポラミン臭化物	10mg	胃腸の異常な緊張を和らげるとともに、胃酸の分泌をおさえ、痛みをしずめます。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	135mg	出すぎた胃酸を中和し、胃酸過多、胸やけ、胃痛に効果をあらわします。

添加物として、ゼラチン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、黄色4号（タートラジン）、緑色3号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

⑴直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。⑵小児の手の届かない所に保管してください。⑶他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）⑷使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社　お客様相談室
フリーダイヤル　0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元
エスエス製薬株式会社
〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
http://www.ssp.co.jp/

Boehringer Ingelheim 提携
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

1208C