

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

新フステル[®]

第②類医薬品

鎮咳去痰薬 せき・たんに 去痰剤 L-カルボシステイン配合

●新フステルは、せきをしずめる成分、のどからんだんの排出をうながす成分、息苦しさをやわらげる成分などの働きで、たんをともなうせきにすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意**❌ してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）**① 次の人は服用しないでください**

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等）**③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**

（眠気等があらわれることがあります。）

④ 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**⑤ 過量服用・長期連用しないでください****相談すること****① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、肝臓病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	腹痛、吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

(表面のつづき)

- ③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られる場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気、下痢
- ④5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 せき、たん

用法・用量 次の1回量を1日3回食後に、水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	8才～14才	8才未満
1回量	4錠	2錠	×服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3)12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先しててください。

成分と作用	成 分	12錠中	作 用
	L-カルボシステイン	750mg	のどにからむ粘稠なたんをうすめるとともに、荒れた気道粘膜を正常化し、たんの排出をうながします。
	ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に作用し、せきの発生を抑えます。
	dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支筋の緊張をやわらげ、息苦しさを除くとともに、せきをしずめます。
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきをしずめます。

添加物：カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ポビドン、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、ブドウ糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

せき・たんの治療には…

- 本剤の服用のほか、次のようなことにも気をつけましょう。
- 栄養や睡眠を十分にとって体力の回復に努めましょう。
 - 室内の空気の乾燥をさけましょう。
 - タバコはひかえ、またうがいなどをしてのどをいたわりましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラがでたり、変色したりすることがあります。
(5)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
(6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>