

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

マイラックスS[®]

第②類医薬品

便秘治療薬

- 便秘は、朝のあわただしさから便意をがまんしたり、不規則な食事や偏食、運動不足、生活環境の変化などが原因となって起こります。便秘が続くと、お腹がはったり、食欲がなくなったり、のぼせたり、また、肌あれ、吹出物の原因となることもあります。
- マイラックスSは、ピサコジルとセンノサイドカルシウムの働きで、自然に近い排便をうながし、また便秘に伴う不快な症状に効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- ① 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
- ② 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- ③ 大量に服用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- ④ 1週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 便秘
- 便秘にともなう次の症状の緩和：頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、肌あれ、吹出物、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

次の1回量を1日1回、就寝前(または空腹時)に水又はぬるま湯で服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。

年 齢	成 人 (15才以上)	15才未満
1回量	1～3錠	×服用しないこと

●空腹時の目安：食後なるべく2時間以上

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は腸溶錠ですので、かんだり、つぶしたりせずに、そのまま服用してください。また、制酸剤又は牛乳と同時に服用しないでください。
- (3)錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



成分と作用

成 分	1錠中	作 用
ピサコジル	5mg	大腸粘膜に作用し、腸管のぜん動運動をたかめ、排便をうながします。
センノサイド カルシウム	13.33mg (センノシドA・B として5.27mg)	生薬センナの有効成分で、大腸内の腸内細菌により代謝され、緩下作用をあらわします。

添加物：カルメロースCa、セルロース、乳糖、白糖、ヒプロメロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、ポビドン、マクロゴール、アラビアゴム、カオリン、炭酸Ca、カルナウバロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸Mg、セラック、タルク、酸化チタン、パレイショデンプン、赤色2号、赤色3号

●本剤の服用により、尿が橙色又は赤色をおびることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

販売元

サンドラッグ・グループ