

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

パステルハップL

【特徴】

- パステルハップLは、ニオイをおさえた微香性タイプで肌にやさしい弱酸性の冷感バップ剤です。
- パステルハップLは、消炎作用のあるアルニカチンキと血行を促進するビタミンEを配合していますので、打撲、腰痛および肩こりなどにすぐれた効きめを発揮します。
- パステルハップLは、粘着性にすぐれた基剤とタテ・ヨコに伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

⚠ (使用上の注意)

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2)5〜6日間使用しても症状がよくなりえない場合。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社 大石膏盛堂
電 話 (0942) 83-2112
受付時間 午前9:00〜11:45 午後1:00〜4:30 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

1日1〜2回薬面の上のライナーをはがして、患部にお貼りください。

＜使用方法＞

- (1) 必要があれば、包帯が固定用粘着テープで固定してください。
(2) 患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
(3) 貼る前に、タテ・ヨコに2〜3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚14g)

成 分	含 量
サリチル酸グリコール	1.0g
l-メントール	0.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.2g
アルニカチンキ	1.0mL(原生薬換算量0.2g)

添加物としてエデト酸Na、ゼラチン、アクリル酸デンプン、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、エタノール、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチェックを開けて保管してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

ここを押して
開けてください。