

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

消炎鎮痛パップ剤

第3類医薬品

販売名: **パステルハッパル**

【特 長】

- パステルハッパルは、においをおさえた微香性タイプで肌にやさしい弱酸性の冷感パップ剤です。
- パステルハッパルは、消炎作用のあるアルニカチンキと血行を促進するビタミンEを配合していますので、打撲、腰痛および肩こりなどにすぐれた効きめを発揮します。

⚠【使用上の注意】

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部にお貼りください。

＜使用方法＞

- (1) 必要であれば包帯、テープ等で止めてください。
- (2) 患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
- (3) 貼る前に、タテ・ヨコに2～3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚14g)

サリチル酸グリコール……………1.0g
l-メントール……………0.5g
トコフェロール酢酸エステル…0.2g
アルニカチンキ……………1.0mL
(原生薬換算量0.2g)

添加物としてエタノール、エデト酸Na、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、ゼラチン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分はこの袋に入れ、開封口をきちんとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂 電話 (0942)83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**

佐賀県鳥栖市本町一丁目933番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

燃
焼
特
性

消
火
方
法



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

消炎鎮痛パップ剤

第3類医薬品

販売名: **パステルハッパL**

【特 長】

- パステルハッパLは、においをおさえた微香性タイプで肌にやさしい弱酸性の冷感パップ剤です。
- パステルハッパLは、消炎作用のあるアルニカチンキと血行を促進するビタミンEを配合していますので、打撲、腰痛および肩こりなどにすぐれた効きめを発揮します。

⚠【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部にお貼りください。

＜使用方法＞

- (1) 必要であれば包帯、テープ等で止めてください。
- (2) 患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
- (3) 貼る前に、タテ・ヨコに2～3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚28g)

サリチル酸グリコール …… 1.0g
l-メントール …… 0.5g
トコフェロール酢酸エステル …… 0.2g
アルニカチンキ …… 1.0mL
(原生薬換算量0.2g)

添加物としてエタノール、エデト酸Na、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、ゼラチン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分はこの袋に入れ、開封口をきちんとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂 電話 (0942)83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)



製造番号

使用期限

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**

佐賀県鳥栖市本町一丁目933番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931