

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

パスキネルテープ

【特 長】

- パスキネルテープは、消炎・鎮痛作用を有するサリチル酸グリコールと ι -メントールを配合し、肩こり、腰痛などにすぐれた効きめを発揮します。
- パスキネルテープは、柔軟性のある肌色基布を使用していますので貼りやすく、目立たなく、粘着性にすぐれ関節部にもピッタリとフィットします。

⚠【使用上の注意】

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

1日1～2回薬面のライナー(はくり紙)をはがし患部にお貼りください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。
- (4) 皮膚のとくに弱い人は、同じところに続けて貼るのはさけてください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

ι -メントール……………5.0g

サリチル酸グリコール……………5.0g

添加物として流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポビドン、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口をきちんとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社 大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電 話 (0942)83-2112

受 付 時 間 午前9:00～11:45

午後1:00～ 4:30(土、日、祝日を除く)

