

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

消炎・鎮痛パップ剤 **温感ダイハップル**

【特徴】

- 温感ダイハップルは、トウガラシエキスを配合により患部に心地よい温感刺激を与え、血液循環作用をよくし、腰痛・肩こり・関節痛などの慢性疾患にすぐれた効果を発揮する温感パップ剤です。
- 温感ダイハップルは、粘着性にすぐれた基剤とタテ・ヨコに伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。



【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
------	-----

皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み
-----	--------------

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社 大石膏盛堂

電 話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00～11:45 午後1:00～4:30(土、日、祝日を除く)

【用法・用量】

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日1～2回患部に貼付してください。

＜使用方法＞

- (1) 必要あれば包帯、テープ等で止めてください。
- (2) 患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
- (3) 貼る前に、タテ・ヨコに2～3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮ふは清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。
- (3) 薬面に触れた手で目、唇、鼻孔、その他の粘膜には、触らないでください。
- (4) 打撲、捻挫にはハレがひいてからご使用ください。
- (5) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (6) 少なくとも入浴の1時間前にははがしてください。また入浴後は30分位してから貼付してください。

【成分・分量】膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚14g)

成 分	含 量
サリチル酸グリコール	1.0g
dI-カンフル	0.3g
酢酸トコフェロール	0.2g
トウガラシエキス	0.3g(原生薬換算量3.75g)

添加物としてエデト酸Na、ゼラチン、カオリン、カルメロースNa、グリセリン、D-ソルビトール、尿素、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発 売 元 株式会社 **CFS**コーポレーション

製造販売元 株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

