

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

ホームバスフェルビナテープ5.0温感

【特長】

- ホームバスフェルビナテープ5.0温感痛みは痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわすフェルビナクを1枚あたり35mg配合しています。
- ホームバスフェルビナテープ5.0温感柔軟性のある基布を使用していますので、粘着性にすぐれ関節部にもよくフィットします。

効能・効果：腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(4)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。(5)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいいください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

フェルビナク5.0g、*l*-メントール3.0g、トコフェロール酢酸エステル2.3g

添加物としてステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブレン、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ノナン酸ニリルアミド、その他2成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチェックを開めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



肩の痛み

腰痛

関節痛

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。
- (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、痛み、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック（アナフィキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.5～6日間使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めの店、または下記にお問い合わせください。
株式会社大石膏盛堂 電話 (0942) 85-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00（土、日、祝日を除く）

在 鹿児島市本町1丁目933番地
株式会社大石膏盛堂
製造販売元



MADE IN JAPAN

