

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。



コーホー-ジクロロZXテープ大判

第2類医薬品

【特 長】

- コーホー-ジクロロZXテープ大判は痛みの原因物質の生成を抑えるジクロロフェナクナトリウムを配合しています。
- コーホー-ジクロロZXテープ大判は柔軟性のある基布を使用していますので貼りやすく、粘着性にすぐれた関節部にもよくフィットします。

【効能・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日1回1枚を患部に貼ってください。ただし、1回あたり1枚を超えて使用しないてください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)1回あたり24時間を超えて貼り続けしないでください。さらに、同じ部位に貼りかえる場合は、その貼付部位に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1〜2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)使用部位に他の外用剤を併用しないでください。

【成分・分量】膏体100g中に次の成分を含んでいます。

ジクロロフェナクナトリウム……………2g
メントール……………3.5g

添加物としてポリイソブチレン、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、BHT、流動パラフィン、脂環炭酸鉛和成化水素樹脂

【保管及び取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべくすみやかに使用してください。

⚠（使用上の注意）

❌してはいけないこと

- 1.次の人は使用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15才未満の小児。
- 2.次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし、むし等又は虫化している患部。
- 3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください
- 4.連続して2週間以上使用しないでください

⚠相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)他の医薬品を使用している人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。(5)次の診断を受けた人 消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ(6)次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド系消炎鎮痛剤(アスピリン等)、ステロイド剤、利尿剤、ジクロロベンジル、選択的セロトニン再取り込み阻害剤(7)高齢者
- 2.使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(らくせつ)(フケ、アカ)のようなる皮膚のはがれ、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	動悸、発疹、かゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、呼吸困難、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがることがあります。また、日光があつた部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3.5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂
電話 (0942)83-2112
受付時間 午前9:00〜午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 987475 117883

製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地