

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

ビ-エスバンEA[®]

△(使用上の注意)



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください

葉などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能
性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持っ
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用
を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください

[効能・効果]

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、
筋肉疲労

製造番号

使用期限

140枚入(20枚×7) サイズ 6.5cm×4.2cm

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電 話 (0942)83-2112 受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

[用法・用量]

表面のライナーをはがし、1日1~2回、患部に
貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

[成分・分量]

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

サリチル酸メチル 6.29g

l-メントール 5.71g

dl-カンフル 1.24g

トコフェロール酢酸エステル 2.0g

添加物としてエステルガム、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、
脂環族醇和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、生ゴム、
BHT、ポリイソブレン、流動パラフィンを含有します。

[保管及び取り扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。