

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

ビーエスパンEα

⚠️【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

製造番号

使用期限

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

サリチル酸メチル……………6.29g

l-メントール……………5.71g

dl-カンフル……………1.24g

トコフェロール酢酸エステル…………2.0g

添加物としてエステルガム、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

140枚入(20枚×7) サイズ 6.5cm×4.2cm

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂** 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電 話 (0942)83-2112 受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

販売名: **ビーエスパン®Eα**

⚠(使用上の注意)



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

製造番号

使用期限

140枚入(20枚×7) サイズ6.5cm×4.2cm

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂** 佐賀県鳥栖市本町一丁目933番地

電話 (0942) 83-2112 受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

MADE IN JAPAN

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

サリチル酸メチル……………6.29g

l-メントール……………5.71g

dl-カンフル……………1.24g

トコフェロール酢酸エステル……………2.0g

添加物としてエステルガム、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。