

胃腸薬

アルファ大草胃腸薬(分包) アルファ大草胃腸錠

特 徴

- アルファ大草胃腸薬(分包)、アルファ大草胃腸錠は、弱った胃腸の働きを高める健胃生薬を主剤に、痛みをやわらげる鎮痛・鎮痙薬、過剰な胃酸を中和し胃壁を保護する制酸薬、消化薬、さらに胃内のガスを取り除く成分などを配合した胃腸薬です。
- 胃痛や胸やけ、胃のもたれ、げっぷなどの不快な症状によく効きます。

⚠ 使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
排尿困難
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき、便秘

その他の注意

1. 母乳が出にくくなる場合があります

効 能

- 胃痛、胸やけ、もたれ(胃もたれ)
- 胃重、胃部不快感、胃酸過多、げっぷ(おくび)
- 胃部・腹部膨満感、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱
- 食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸つかえ
- はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐



食欲不振



胃痛、胸やけ

用法・用量

次の量を、食間又は食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回量		1 日服用回数
	分包	錠剤	
成人(15 歳以上)	1 包	4 錠	3 回
11 歳以上 15 歳未満	2/3包	2 錠	
8 歳以上 11 歳未満	1/2包	2 錠	
5 歳以上 8 歳未満	1/3包	1 錠	
3 歳以上 5 歳未満	1/4包	服用しないでください	
3 歳未満	服用しないでください		

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人の 1 日服用量 3 包 (3.6g) 又は 12 錠中

成 分	含 量	作 用
オウレン末(黄連末)	250 mg	苦味や芳香のある生薬で、胃の機能を高め食欲を増進させます。
ニンジン末(人参末)	300 mg	
ケイヒ末(桂皮末)	300 mg	
ショウキョウ末(生姜末)	100 mg	
カンゾウ末(甘草末)	300 mg	荒れた胃壁を保護し、痛みを和らげます。
ロートエキス散	300 mg	胃酸の分泌を抑え、痛みを鎮めます。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	450 mg	出過ぎた胃酸を中和し、荒れた胃の粘膜を保護します。
沈降炭酸カルシウム	895 mg	出過ぎた胃酸を中和します。
牛胆汁エキス末	150 mg	脂肪の消化を助け、胆汁の分泌を促します。
ジメチルポリシロキサン (ジメチコン)	60 mg	胃腸内のガスを取り除き、膨満感、不快感を解消します。

添加物としてバレイショデンプン、ℓ-メントール、CMC-Ca、ポビドン、ステアリン酸Mg*を含有します(*はアルファ大草胃腸錠のみ)。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1 包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2 日以内に使用してください。



お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：03 (3370) 7174 (代表)

受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社

横須賀市森崎1-17-15