

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。


第②類
医薬品

便秘薬

たいそうがん 大草丸

特徴

- 大草丸(たいそうがん)は、腸の運動を改善し排便をうながす成分、腸にうるおいを与えスムーズな排便を助ける成分及び腹痛を緩和する成分からなる便秘薬です。
- 肌あれや腹部膨満といった便秘に伴う不快な症状にも良く効きます。
- 小粒でのみやすく、便秘の状態にあわせて服用量を細かく調節できます。



⚠ 使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

効能

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、
食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、
腸内異常醗酵、痔



頭重



肌あれ

用法・用量

次の量を、なるべく空腹時に、水またはお湯でかまずに服用してください。また服用間隔は4時間以上おいてください。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	15 ～ 20 丸	1 ～ 3 回
11 歳以上 15 歳未満	10 ～ 13 丸	
7 歳以上 11 歳未満	8 ～ 10 丸	
3 歳以上 7 歳未満	5 ～ 6 丸	
3 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成 分


成人の 1 日最大服用量 60 丸（3 包）中

成 分	含 量	作 用
ダイオウ末（大黄末）	900 mg	各種アントラキノン誘導体が腸の働きを活発にし、排便をうながします。
アロエ末	300 mg	
センナ末（施那末）	600 mg	
マシニン（麻子仁）	1200 mg	腸にうるおいを与え、便を軟らかくして排便をたすけます。
カンゾウ末（甘草末）	600 mg	鎮痛・鎮痙作用により腹痛を緩和します。
シャクヤク末（芍薬末）	600 mg	
センキュウ末（川芎末）	800 mg	鎮痛作用のほか、頭重やのぼせに効果があります。

添加物としてハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。



包 装

20包 36包 460丸 1200丸 3600丸

お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：03 (3370) 7174（代表）

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

（独）医薬品医療機器総合機構
副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木 3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎 1-17-15