

下線部：  
2009年4月改訂

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類  
医薬品

漢方薬

び ゆう

## オオクサ鼻優S

### 特 徴

- オオクサ鼻優Sは漢方薬「葛根湯加川芎辛夷」（かっこんとうかせんきゅうしんい）の抽出エキスを飲みやすい糖衣錠にした漢方製剤です。
- 比較的体力がある方の慢性鼻炎，鼻づまり，蓄膿症に良く効きます。
- 眠くなりにくいので，工作中や外出先でも安心して服用に出来ます。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人，体の弱い人）。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬により発疹・発赤，かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。
    - むくみ，排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。
    - 高血圧，心臓病，腎臓病，甲状腺機能障害
- 次の場合は，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 服用後，次の症状があらわれた場合。

| 関係部位  | 症 状           |
|-------|---------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤，かゆみ     |
| 消 化 器 | 悪心，食欲不振，胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称     | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する，顔や手足がむくむ，まぶたが重くなる，手がこわばる，血圧が高くなる，頭痛等があらわれる。 |

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなりません。
3. 長期連用する場合には，医師又は薬剤師に相談してください

### 効 能

比較的体力があるものの次の諸症：  
鼻づまり，蓄膿症（副鼻腔炎），  
慢性鼻炎



鼻づまり



慢性鼻炎

**用法・用量**

次の量を食前又は食後に、水またはお湯でかまずに服用してください。

| 年 齢         | 1回量        | 1日服用回数 |
|-------------|------------|--------|
| 成人(15歳以上)   | 4錠         | 3回     |
| 7 歳以上15歳未満  | 3錠         |        |
| 5 歳以上 7 歳未満 | 2錠         |        |
| 5歳未満        | 服用しないでください |        |

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**成 分**


12錠(成人の1日服用量)中、次の成分及び分量からなる葛根湯加川芎辛夷水製エキス3250mgを含んでいます。

| 成 分            | 分 量  | 成 分              | 分 量  |
|----------------|------|------------------|------|
| カ ッ コ ン(葛 根)   | 2.0g | シ ョ ウ キ ョ ウ(生 姜) | 0.5g |
| マ オ ウ(麻 黄)     | 2.0g | カ ン ゾ ウ(甘 草)     | 1.0g |
| ケ イ ヒ(桂 皮)     | 1.0g | セ ン キ ュ ウ(川 芎)   | 1.5g |
| シ ャ ク ヤ ク(芍 薬) | 1.0g | シ ン イ(辛 夷)       | 1.5g |
| タ イ ソ ウ(大 棗)   | 1.5g |                  |      |

添加物として乳糖、ゼラチン、炭酸Ca、タルク、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、セラック、アラビアゴム、酸化チタン、ヒマシ油、白糖、カルナウバロウを含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

**【品質について】**

大草薬品株式会社 「お客様相談係」  
電話：046-834-1193〔月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)〕

**【販売について】**

大草薬品販売株式会社 「お客様相談係」  
電話：06-6779-5202〔月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)〕

(独)医薬品医療機器総合機構 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元

**大草薬品販売株式会社**  
大阪市天王寺区上汐5-1-18

製造販売元

**大草薬品株式会社**  
神奈川県横須賀市森崎1-17-15