



ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

漢 方 薬

オオクサ 桂 枝 茯 苓 丸

特 徴

- 漢方薬「桂枝茯苓丸」(けいしぶくりょうがん)は、瘀血(おけつ、下腹部に抵抗や圧痛を認める症状)を除く処方としてよく用いられており、月経不順や月経痛、更年期障害など女性特有の症状に良く効きます。
- もちろん女性だけではなく、比較的体力がある男性の肩こり、めまい、頭重にも使用されます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

効 能

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ



月経不順



更年期障害



頭重・めまい





用法・用量

次の量を、食前又は空腹時に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	20丸（1包）	3回
7歳以上15歳未満	14丸（約2/3包）	
7歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分


成人の1日服用量60丸（3包）中

成 分	含 量
ケ イ ヒ 末（桂皮末）	1200 mg
ブ ク リ ヨ ウ 末（茯苓末）	1200 mg
ボ タ ン ピ 末（牡丹皮末）	1200 mg
ト ウ ニ ン 末（桃仁末）	1200 mg
シャクヤク末（芍薬末）	1200 mg

添加物として寒梅粉、ハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。



お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：03（3370）7174（代表）

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社

横須賀市森崎1-17-15

