

漢 方 薬

オオクサ 桂 枝 茯 苓 丸

特 徴

- 漢方薬「桂枝茯苓丸」(けいしぶくりょうがん)は、瘀血(下腹部に抵抗や圧痛を認める症状)を除く処方としてよく用いられており、月経不順や月経痛、更年期障害など女性特有の症状に良く効きます。
- もちろん女性だけではなく、比較的体力がある男性の肩こり、めまい、頭重にも使用されます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

効 能

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^注、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

<効能・効果に関連する注意>

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。



月経不順



更年期障害



頭重・めまい

用法・用量

次の量を、食前又は空腹時に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	20丸（1包）	3回
7歳以上15歳未満	14丸（約2/3包）	
7歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分


成人の1日服用量60丸（3包）中

成 分	含 量
ケ イ ヒ 末（桂皮末）	1200 mg
ブ ク リ ョ ウ 末（茯苓末）	1200 mg
ボ タ ン ピ 末（牡丹皮末）	1200 mg
ト ウ ニ ン 末（桃仁末）	1200 mg
シャクヤク末（芍薬末）	1200 mg

添加物として寒梅粉、ハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。



包 装 1200丸

お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室
電 話：03（3370）7174（代表）
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

（独）医薬品医療機器総合機構
副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎1-17-15