

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

漢方薬 オオワサ 柴胡桂枝湯エキス 顆粒(分包)

特徴

- こじれた“かぜ”はなかなか治りにくいものです。寒けがしたり、微熱や寝汗があったり、頭痛や上半身の痛みがとれず、食欲がなく、胸や脇にかけて重苦しいなど、いつまでもスッキリしません。
- 漢方薬「柴胡桂枝湯」(さいこけいしとう)は、このような症状に大変効果のある薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位(かぜの場合には1週間位)服用しても症状がよくなりえない場合。

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効 能

多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はき気などのある感冒、風邪の後期の症状



はき気などのある感冒



風邪の後期

用法・用量

次の量を、食前又は食間に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	1 包	3 回
7 歳以上 15 歳未満	2/3 包	
4 歳以上 7 歳未満	1/2 包	
2 歳以上 4 歳未満	1/3 包	
2 歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人の1日服用量3包(7.5 g)中、次の成分及び分量からなる柴胡桂枝湯水製工キス3500 mgを含んでいます。

成 分	分 量
サ イ コ (柴 胡)	3.33 g
ハ ン ゲ (半 夏)	2.67 g
ケ イ ヒ (桂 皮)	1.67 g
シャクヤク (芍 薬)	1.33 g
オ ウ ゴ ン (黄 芩)	1.33 g
ニ ン ジ ン (人 参)	1.33 g
タ イ ソ ウ (大 棗)	1.33 g
カ ン ゾ ウ (甘 草)	1.00 g
ショウキョウ (生 姜)	0.67 g

添加物としてバレイショデンプン、乳糖、無水ケイ酸、白糖、CMC-Caを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



その他の注意

- (1) 本剤は生薬のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。薬効に変わりはありません。
- (2) 本剤は多少吸湿して色が濃くなることがありますが、薬効に変わりはありません。

お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：03 (3370) 7174 (代表)

受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社
横須賀市森崎1-17-15