

漢 方 薬  
オオクサ八味丸  
オオクサ八味丸 (分包)

特 徴

- 漢方薬「八味地黄丸」(はちみじおうがん)は、中高年の方の体力の衰えや、老化による腰痛、残尿感、夜間頻尿、軽い尿漏れなどによく効きます。
- オオクサ八味丸は、「八味地黄丸」の処方に基づき8種類の生薬末をハチミツで練り合わせた丸剤で、独特な香味を持ち、大変のみやすくなっています。
- 高血圧に伴う肩こり、頭重、耳鳴りにも適しています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位  |   | 症 状           |
|-------|---|---------------|
| 皮     | ふ | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消 化   | 器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| そ の 他 |   | のぼせ、どうき       |

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
下痢

効 能

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ



下肢痛



かすみ目



排尿困難

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。

| 年 齢          | 1 回 量       | 1 日服用回数 |
|--------------|-------------|---------|
| 成人(15 歳以上)   | 20 丸(1 包)   | 3 回     |
| 7 歳以上 15 歳未満 | 14 丸(約2/3包) |         |
| 7 歳未満        | 服用しないでください  |         |

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成 分


成人の 1 日服用量60丸（3包）中

| 成 分               | 含 量     |
|-------------------|---------|
| ジ オ ウ (地 黄)       | 1600 mg |
| サ ン シ ュ ユ (山 茱 萸) | 800 mg  |
| サ ン ヤ ク (山 薬)     | 800 mg  |
| タ ク シ ャ (沢 瀉)     | 600 mg  |
| ブ ク リ ョ ウ (茯 苓)   | 600 mg  |
| ポ タ ン ピ (牡 丹 皮)   | 600 mg  |
| ケ イ ヒ (桂 皮)       | 200 mg  |
| 加 エ プ シ 末 (加工附子末) | 200 mg  |

添加物として寒梅粉，ハチミツ，セラックを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。



**包 装** 1200丸 5000丸

お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：03(3370)7174（代表）

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

(独)医薬品医療機器総合機構

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

発売元



**日邦薬品工業株式会社**

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



**大草薬品株式会社**

神奈川県横須賀市森崎1-17-15