

漢方薬
オオクサ八味丸
オオクサ八味丸 (分包)

特 徴

- 漢方薬「八味地黄丸」(はちみじおうがん)は、中高年の方の体力の衰えや、老化による腰痛、残尿感、夜間頻尿、軽い尿漏れなどによく効きます。
- オオクサ八味丸は、「八味地黄丸」の処方に基づき8種類の生薬末をハチミツで練り合わせた丸剤で、独特な香味を持ち、大変のみやすくなっています。
- 高血圧に伴う肩こり、頭重、耳鳴りにも適しています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位		症 状
皮 膚		発疹・発赤、かゆみ
消 化 器		食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他		動悸、のぼせ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ



足腰のしびれ



かすみ目



排尿困難

用法・用量

次の量を食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	20 丸(1 包)	3 回
7 歳以上 15 歳未満	14 丸(約 2/3 包)	
7 歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量


成人の 1 日服用量 60 丸 (3 包) 中

成 分	含 量
ジ オ ウ (地 黄)	1600 mg
サ ン シ ュ ユ (山 茱 萸)	800 mg
サ ン ヤ ク (山 薬)	800 mg
タ ク シ ャ (沢 瀉)	600 mg
ブ ク リ ョ ウ (茯 苓)	600 mg
ポ タ ン ピ (牡 丹 皮)	600 mg
ケ イ ヒ (桂 皮)	200 mg
加 エ プ シ 末 (加工附子末)	200 mg

添加物として寒梅粉、ハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変化します)。



包 装 1200 丸 5000 丸

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 03(3370)7174 (代) (9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木 3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎 1-17-15