

漢方薬
ちょう けつ がん®
オオクサ調血丸

特 徴

- オオクサ調血丸は漢方薬「桂枝茯苓丸」（けいしぶくりょうがん）に緩下剤の
大黃を加えた独自の処方です。
- 比較的体力のある方の月経不順や月経困難症，更年期障害に伴うのぼせや動
悸などに効果があります。
- 女性だけではなく，男性の打撲症にも用いられます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなります）

1. 授乳中の方は本剤を服用しないか，本剤を服用する場合は授乳を避けてくだ
さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人，体の弱い人）。
（4）胃腸が弱く下痢しやすい人。
（5）今までに薬により発疹・発赤，かゆみ等を起こしたことがある人。
（6）次の医薬品を服用している人。瀉下薬（下剤）
2. 次の場合は，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師又は薬剤師に相談
してください
（1）服用後，次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤，かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢，腹痛，食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに
医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ，黄疸（皮ふや白目が黄色 くなる）等があらわれる。

- （2）1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので，このような症状の継続又は増強が見
られた場合には，服用を中止し，医師又は薬剤師に相談してください
軟便，下痢

効 能

○月経不順、月経困難症、打撲症、
更年期の神経症・更年期障害に
伴うのぼせ・動悸



月経不順



更年期障害

用法・用量

次の量を、食前又は空腹時に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	20～30丸 (1～1.5包)	3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

成 分


100丸(5包)中

成 分	含 量	成 分	含 量
ケ イ ヒ 末 (桂 皮 末)	2.0g	ブクリョウ末 (茯 苓 末)	2.0g
ボ タ ン ピ 末 (牡丹皮末)	2.0g	トウニン末 (桃 仁 末)	2.0g
シャクヤク末 (芍 薬 末)	2.0g	ダイオウ末 (大 黄 末)	0.5g

添加物として寒梅粉、ハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

【品質について】

大草薬品株式会社 「お客様相談係」

電話：046-834-1193〔月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)〕

【販売について】

大草薬品販売株式会社 「お客様相談係」

電話：06-6779-5202〔月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)〕

(独)医薬品医療機器総合機構 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元

大草薬品販売株式会社

大阪市天王寺区上汐5-1-18

製造販売元

大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15