

〈効能・効果〉

(1) 頭痛・歯痛・
抜歯後の疼痛・
咽喉痛・耳痛・
関節痛・神経
痛・腰痛・筋肉
痛・肩こり痛・打
撲痛・骨折痛・ね
んざ痛・月経痛(生
理痛)・外傷痛の鎮痛
(2) 悪寒・発熱時の解熱



〈成分・分量〉

1日量(8錠)中

アセトアミノフェン

.....600mg

エテンザミド

.....540mg

無水カフェイン

.....140mg

アリルイソプロピル

アセチル尿素.....120mg

添加物として、ヒドロキシブ

ロピルセルロース、クロスCMC-Na、

ステアリン酸Mg、タルクを含有する。

第2類医薬品

大峰 カルミン錠A

〈用法・用量〉

15歳以上.....1回 4錠
7歳以上15歳未満.....1回 2錠
5歳以上7歳未満.....1回 1錠
5歳未満は服用しないこと。
1日2回を限度とし、なるべく空腹
時をさけて服用する。服用間隔は
6時間以上おくこと。※小児に服用
させる場合には、保護者の指導監
督のもとに服用させること。

《保管及び取扱上の注意》

(1) 直射日光の当たらない湿気
の少ない涼しい所に保管してく
ださい。(2) 小児の手の届かない
所に保管してください。(3)
他の容器に入れ替えないでく
ださい。(誤用の原因になったり
品質が変わる。)(4) 配置期限
を過ぎた製品は服用しないで
ください。

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574

お問い合わせ先 消費者相談窓口 電話 0745-22-3601

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



外袋

内袋

☒ してはいけないこと

⚠ 使用上の注意

解熱鎮痛薬

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起
こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを
起こしたことがある人。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用
しないこと 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬。3. 服用後、乗物又は
機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)(4) 服用前後は
飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売
者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けて
いる人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 水痘(水ぼうそう)若しくは
インフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(4)
高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の診断
を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、悪苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死 剥離症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲 の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出 る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、 全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、 下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、悪苦しくなる、 空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、悪苦しい等があらわ れる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は
増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること 眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って
医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

配置期限 2018.8 IFD

2回分 8錠入 ¥250. 品目番号 奈良9-130-2巻 AS-10A

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931