

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

大峰薬草便秘薬

毎日のお通じは健康のバロメーター。便秘が長引けば、体のリズムが崩れやすくなってきます。

大峰薬草便秘薬は、3種類の薬草（センナ、ダイオウ、オウバク）から作られた便秘薬で、便秘や、便秘に伴う症状にすぐれた効果があります。

便秘の度合いは人によって様々です。その人にあった服用量が必要になってきます。説明文書の用法及び用量の項目をよく読んで、ご自分の体にあった分量を服用してください。

《特 徴》

- センナ、ダイオウが含有する下剤成分センノサイドA、Bは、大腸刺激性の緩下剤で、大腸を刺激して腸の運動を活発にし、便秘に効力を発揮します。
- オウバクの主成分ペルペリンは抗菌作用があり、便秘によって生じた腸内異常醗酵に効力を発揮します。

⚠使用上の注意

❌してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、悪心・嘔吐

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

《効能又は効果》

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：

頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、
腸内異常醗酵、痔

《用法及び用量》

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	2 ～ 5 錠	1 回
11歳以上15歳未満	1 ～ 4 錠	
7 歳以上11歳未満	1 ～ 3 錠	
7 歳未満	服用しないこと	

1 日 1 回就寝前（又は空腹時）に服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら
少しずつ増量又は減量してください。

《用法・用量に関する注意》

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて
ください。

《成分及び分量》

大峰薬草便秘薬の 1 日量（5 錠）中に含まれる成分及び分量
は以下のとおりです。

センナ末 600mg

ダイオウ末 200mg

オウバク末 100mg

添加物として、デヒドロ酢酸Na、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ
素、CMC-Ca、セルロースを含有する。

本剤は生薬を用いた製品なので、錠剤の色調が多少異なることが
あります。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管し
てください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品
質が変わる。）
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22-3601(代)

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574