

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

いれいとう
胃苓湯エキス錠〔大峰〕

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位（急性胃腸炎に服用する場合には5～6回、食あたり、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合

《効能又は効果》

水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴う次の諸症
食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

《用法及び用量》

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成 人（15歳以上）	4 錠	3 回
15歳未満 7歳以上	3 錠	
7歳未満 5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(裏面もお読みください)

《成分及び分量》

胃苓湯エキス錠〔大峰〕の1日量(12錠)中には下記生薬より得た胃苓湯エキス粉末1600mgを含む。

ソウジュツ	1.25 g	ケイヒ	1.0 g
コウボク	1.25 g	タイソウ	0.75 g
チョレイ	1.25 g	シヨウキョウ	0.75 g
タクシャ	1.25 g	カンゾウ	0.5 g
ビャクジュツ	1.25 g	チンピ	1.25 g
ブクリョウ	1.25 g		

添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mg、乳糖を含有する。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は、服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22-3601(代)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574