

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

大峰エキス錠黄連解毒湯A

おうれん げ どくとう

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位（鼻出血、二日酔に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合

《効能又は効果》

比較的体力があり、のほせぎみで顔色赤く、いらいらする傾向のある次の諸症

鼻出血、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、ど
うき

（裏面もお読みください）

《用法及び用量》

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	3 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	2 錠	
7 歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

《成分及び分量》

大峰エキス錠黄連解毒湯Aの1日量（9錠）中には下記生薬より得た黄連解毒湯エキス900mgを含む。

オウレン……………1.5 g オウゴン……………3.0 g

オウバク……………1.5 g サンシシ……………2.0 g

添加物として、ステアリン酸Mg、タルク、CMC-Ca、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は、服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22-3601(代)

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574