

この添付文書は、本剤の服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

かっこんとう

葛根湯エキス顆粒〔大峰〕

漢方製剤



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

（裏面もお読みください）

効 能

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15才以上)	1 包	3 回
7才～14才	2／3包	
4才～6才	1／2包	
2才～3才	1／3包	
2才未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分（3包6.0g中）

下記生薬より得た葛根湯エキス（3/4量）3600mgを含む。

カッコン	6.0g	シャクヤク	2.25g
マオウ	3.0g	カンゾウ	1.5g
タイソウ	3.0g	ショウキョウ	0.75g
ケイヒ	2.25g		

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、乳糖、二酸化ケイ素

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18



製造販売元
大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574

本品のお問い合わせは下記にお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
（フリーダイヤル ☎0120-54-7080）
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30