

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方薬

葛根湯エキス顆粒〔大峰〕

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4)胃腸の弱い人。
 - (5)発汗傾向の著しい人。
 - (6)高齢者。
 - (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8)次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |
- まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
- | 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、
ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法及び用量

次の量を１日３回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満 7 歳以上	2/3包	
7 歳未満 4 歳以上	1/2包	
4 歳未満 2 歳以上	1/3包	
2 歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

葛根湯エキス顆粒〔大峰〕の１日量〔３包（１包 2.0g）〕中に含まれる成分及び分量は以下のとおりです。

カッコン	6.0g	シャクヤク	2.25g
マオウ	3.0g	カンゾウ	1.5g
タイソウ	3.0g	ショウキョウ	0.75g
ケイヒ	2.25g		

上記生薬より得た葛根湯エキス（3/4量）3600mgを含む。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、乳糖、二酸化ケイ素を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)１包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、２日以内に使用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22-3601(代)

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574