

＊：2009年 4 月に改訂しました。

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

漢方薬

じゅう み はい どく とう

十味敗毒湯エキス錠〔大峰〕



【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

＊ 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

1 ヶ月位（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合。

3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

【成分・分量】本品1日量(12錠)中

「日局」サ イ コ…………… 1.5 g	「日局」カ ン ゾ ウ…………… 0.5 g
「日局」キ キ ヨ ウ…………… 1.5 g	「日局」ケ イ ガ イ…………… 0.5 g
「日局」センキュウ…………… 1.5 g	「日局」ショウキョウ…………… 0.16 g
「日局」ブクリョウ…………… 1.5 g	オ ウ ヒ…………… 1.5 g
「日局」レンギョウ…………… 1.5 g	「日局」ド ク カ ツ…………… 1.0 g
「日局」ボ ウ フ ウ…………… 1.0 g	

上記生薬より得た十味敗毒湯エキス2000mgを含みます。

なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースCa、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化アルミナマグネシウム、乳糖を含みます。

＊【効能・効果】 体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症：

化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。（食間とは、食後2～3時間を指します。）

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	4 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	3 錠	
7 歳未満 5 歳以上	2 錠	
5 歳未満	服用しないで下さい	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果にはかわりありませんので安心して服用して下さい。

【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目29番地 1

電 話：03（3639）9771

受付時間：9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元

日邦薬品工業株式会社

東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台

http://www.nippo-yakuhin.jp/



発 売 元

伸 和 製 薬 株 式 会 社

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目29番地 1



製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地