

*2013年1月改訂(住所変更に伴う改訂)
2011年11月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

漢方薬

しょうさい ことう

小柴胡湯エキス錠〔大峰〕

!

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
- むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
- 肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
- (8) インターフェロン製剤で治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(かぜの後期の諸症状に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】 本品1日量(12錠)中

「日局」サ イ コ……3.5g	「日局」タ イ ソ ウ……1.5g
「日局」ハ ン ゲ……2.5g	「日局」ニ ン ジ ン……1.5g
「日局」ショウキョウ……0.5g	「日局」カ ン ゾ ウ……1.0g
「日局」オ ウ ゴ ン……1.5g	

上記生薬より得た小柴胡湯エキス(1/2量)2000mgを含みます。
なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースCa、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化アルミナマグネシウム、乳糖を含みます。

【効能・効果】 体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症：
食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	4 錠	3回
15歳未満7歳以上	3 錠	
7歳未満5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないで下さい	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。

*【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室
〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号
電 話：03(3807)3780
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

* 発 売 元

伸和製薬株式会社
東京都荒川区南千住5丁目17番8号

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574番地